

CIĄGI LICZBOWE

1. Dane są ciągi liczbowe:

a) $(1, \frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{7}, \dots)$ b) $(10, 7, 4, 1, \dots)$ c) $(2, 4, 2, 4, 2, \dots)$ d) $(1, 1, 2, 6, 24, \dots)$

e) $(1, \frac{1}{2}, 1, \frac{1}{3}, 1, \frac{1}{4}, \dots)$

Dla każdego ciągu wyznacz a_{10} oraz a_n .

2. Dla poniższych ciągów

a) $a_n = \frac{2^n}{(n-1)!}$ b) $a_n = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{n(n+1)}$ c) $\begin{cases} a_1 = 2 \\ a_{n+1} = a_n + 2 \cdot 10^{n-1} \end{cases}$

Podać a_1 , a_3 , a_{2k-1} .

3. Zbadać monotoniczność ciągów

a) $a_n = \frac{2n}{n+1}$ b) $a_n = \frac{n+1}{n!}$ c) $a_n = \log \frac{n+1}{n}$

d) zbadać monotoniczność ciągów z zadania 2.

4. Zbadać ograniczoność ciągów

a) $a_n = \frac{n^2}{n^2+1}$ b) $a_n = \frac{n+1}{n!}$ c) $a_n = \frac{1}{2+1} + \frac{1}{2^2+2} + \frac{1}{2^3+3} + \dots + \frac{1}{2^n+n}$
d) $a_n = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{n(n+1)}$ e) $a_n = \sqrt{n^2+1} - n$

5. Uzasadnić, że poniższe ciągi są zbieżne

a) $a_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n}$ b) $a_n = \frac{1}{3^1+1!} + \frac{1}{3^2+2!} + \dots + \frac{1}{3^n+n!}$

6. Dany jest ciąg liczbowy $a_n = \frac{n}{n+1}$. Wyznaczyć dla zadanego $\varepsilon > 0$ taką liczbę naturalną $N=N(\varepsilon)$, że $|a_n - 1| < \varepsilon$ dla każdego $n > N$. Uzupełnić poniższą tabelkę.

ε	0,1	0,01	0,03	0,002
N				

Udowodnić z definicji granicy ciągu, że $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$

7. Udowodnić z definicji granicy ciągu, że

a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{1-n} = -2$ b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-n^2}{1+n^2} = -1$

8. Uzasadnić, że ciąg $a_n = \frac{1+(-1)^n}{2}$ nie posiada granicy.

9. Obliczyć granice ciągów

$$\text{a) } a_n = \frac{\sqrt{n+2}}{3n-3} \quad \text{b) } b_n = \frac{2n^2+n\sqrt{n^2+1}}{1-3n^2} \quad \text{c) } c_n = \frac{1+2+2^2+\dots+2^n}{1+3+3^2+\dots+3^n}$$

$$\text{d) } d_n = \sqrt{n^2+4n} - \sqrt{n^2+4n+5} \quad \text{e) } e_n = \frac{2n^2+3(-1)^n}{n^2+1} \quad \text{f) } f_n = \frac{1+2+3+\dots+n}{2n^2+n+1}$$

$$\text{g) } g_n = \frac{2^{n+2}+3^{n+1}}{3^{n-2n}} \quad \text{h) } h_n = \sqrt[n]{2^n+3^{-n}+1} \quad \text{i) } i_n = \sqrt[n]{3 \cdot 5^n+2 \cdot 7^n}$$

$$\text{j) } j_n = \sqrt[n]{1^2+2^3+\dots+n^2} \quad \text{k) } k_n = \sqrt[n]{\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\dots+\frac{1}{2^n}} \quad \text{l) } l_n = \sqrt{5^n+4^n} - \sqrt{5^n+1}$$

$$\text{m) } t_n = \frac{n^3}{(n+3)!} \quad \text{n) } p_n = \frac{3n!+n^2}{(n+2)!+2} \quad \text{o) } x_n = \left(1 + \frac{2}{n+3}\right)^{1-3n} \quad \text{p) } y_n = \left(\frac{2n+1}{2n+3}\right)^{3n-1}$$

$$\text{r) } z_n = n \ln \frac{n+2}{n} \quad \text{s) } r_n = \sqrt[n]{2n^2+n+1}$$

ZADANIA DODATKOWE

1. Wykazać, że ciąg $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ jest ograniczony i monotoniczny

2. Obliczyć granice ciągów

$$\text{a) } a_n = \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}}$$

$$\text{b) } b_n = \frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \dots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$$

3. Wykazać z definicji granicy ciągu, że $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$